

Ueber

Selbstinfection und Spätblutung in Puerperio.

Inaugural-Abhandlung

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Hofrathes, Obermedicinalrathes, Professors

Dr. von Hecker,


Director der Gebäranstalt dahier,

der medicinischen Facultät zu München vorgelegt

von

Max Stollreither

app. Arzt aus Mindelheim.



München, 1877.

Königliche Hof- & Universitäts-Buchdruckerei
von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber

Selbstinfection und Spätblutung in Puerperio.



Inaugural-Abhandlung

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Hofrathes, Obermedicinalrathes, Professors

Dr. von Hecker,

Director der Gebäranstalt dahier,

der medicinischen Facultät zu München vorgelegt

von

Max Stollreither

app. Arzt aus Mindelheim.



München, 1877.

Königliche Hof- & Universitäts-Buchdruckerei
von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Bekanntlich kommt es nicht selten vor, daß eine Wöchnerin in der zweiten und auch in einer späteren Woche des Puerperiums noch Blut aus den Genitalien verliert, sei es nun, daß die Lochien fortwährend noch Blut enthalten, oder daß plötzlich eine förmliche Blutung den Wochenfluß unterbricht.

Normaler Weise verliert eine Wöchnerin am ersten Tage fast reines Blut; einen oder zwei Tage noch hält ein dunkelrother Ausfluß an, dem ein ebenso langandauernder hellerer nur wenig Blut enthaltender folgt. Dieser Termin wird nun nicht immer eingehalten, es haben aber auch noch länger fortdauernde blutig gestreifte Lochien oder durch Kleinigkeiten veranlasste wiederkehrende geringere Blutungen keine praktische Bedeutung.

Nun gibt es aber dann Fälle, in denen — abgesehen von heftigen Blutungen, sofort post partum — sich die blutigen Lochien bis in die zweite Woche hineinziehen und dann als schwächende Blutung betrachtet werden müssen; — oder es tritt in späteren Tagen eine mehr oder minder heftige Blutung auf, die einen sofortigen Tod oder wenigstens eine sehr bedenkliche, hochgradige Anaemie zur Folge hat.

Ein ähnlicher, hieher gehöriger Fall kam mir am Anfange meiner ärztlichen Thätigkeit als praktischer Arzt

zur Beobachtung und er gab mir den Stoff zu diesen Blättern.

Frau G. M. 34 Jahre alt. 9. Gebärende, klein und von gracilem Wuchse, war im 5. Monat schwanger. Sämmtliche frühere Schwangerschaften und Geburten verliefen gut, doch verlor die Frau seit ihrem 6. partus, der ein praematuras war, bei jeder folgenden Geburt eine mehr oder minder große Menge Blutes. Von den Kindern wurde keines an der Brust aufgezogen. Die Milchabsonderung dauerte nach keiner Geburt über Gebühr lang. Von früheren schwereren Krankheitsprozessen wußte Patientin nichts anzugeben.

Das Verhalten der G. M. während der letzten und wahrscheinlich auch während der früheren Schwangerschaften war insofern kein ganz angemessenes, als sie stets bis in die letzten Tage vor der Geburt schwere Bauersarbeit zu verrichten hatte.

Im Verlaufe des 10. Febr. d. J. verlor G. M. plötzlich eine nicht unbedeutende Menge Blutes; während der Nacht Eintritt von Wehen, worauf bald spontane Ausstossung einer männlichen Frucht erfolgte, die dem Ende des 5. Monats angehörte (der foetus war $22\frac{1}{2}$ C. lang; lanugo am ganzen Körper; am Kopf zeigte sich schon Haarbildung; die Nägel der Zehen waren schon etwas hornartig geworden.) Der foetus selbst befand sich in „lipoider Degeneration.“¹⁾

Die Ursache des Absterbens der Frucht mag hier wohl nicht in einer Erkrankung des Eies gelegen haben, sondern wohl auf Rechnung der Mutter zu schreiben sein, die wie aus der Anamnese zu entnehmen war stets blaß, selbst wachsgelb ausgesehen haben soll. Und es liegt die

¹⁾ Hecker und Buhl. Kl. d. Geb. p. 327.

Annahme ziemlich nahe, daß die anaemische Mutter nicht im Stande war den foetus zu ernähren; die Frucht mußte absterben nachdem sie in der Zufuhr von Nahrung beeinträchtigt oder am Ende gänzlich davon abgeschnitten war. Prof. Schröder¹⁾ sagt darüber: „Alle Momente, die dem foetus die Zufuhr von Nahrung verkümmern oder gänzlich aufheben, können ihn zum Absterben bringen. — — — Auch chronische und acute Anaemie der Mutter kann in dieser Hinsicht schädlich wirken (letztere kann den Erstickungstod der Frucht herbeiführen, wie wir in einem Fall von hochgradigem Blutverlust in Folge der Ruptur eines Varix bei Zwillingsschwangerschaft beobachten konnten)“:

In wie ferne die Disposition zum Abortus gelegen war in Anomalien der Decidua (abnorm geringe Entwicklung der decidua oder eine Atrophie der Schleimhaut, in Verbindung mit der lipoid degenerirten Frucht oder in dem Tode der letzteren allein kann ich deshalb nicht unterscheiden weil bei meinem Erscheinen am Krankenbette — ich wurde erst nach Tagen gerufen — von den Anhängen der Frucht nichts mehr zu sehen, — ich also nur auf das Referat der anwesenden Hebamme angewiesen war; doch scheint als das Näherliegende der abgestorbene foetus allein schon im Stande gewesen zu sein Abortus herbeizuführen, denn nach den geburtshilflichen Lehrbüchern hat eine abnorm geringe Entwicklung oder Atrophie der Decidua nur dann einen schädlichen Einfluß auf die Entwicklung des Eies, wenn sie an der Eipеріpherie selbst stattfindet, wenn sie also die Decidua serotina oder reflexa betrifft, ferner erklärt sich der Tod des foetus hinreichend an Nahrungsmangel bei einer anämischen Mutter. Einer etwaigen auch möglichen Annahme, daß bei

¹⁾ Lehrbuch der Geburtshilfe von Prof. Dr. C. Schröder. Bonn 1874 p. 461.

Anaemie auch der Uterus anämisch sei, hochgradige Anaemie des Uterus aber Contractionen desselben herbeiführen kann¹⁾ ist leicht zu begegnen, indem dieser directe Einfluss auf den Uterus, wenn auch experimentell erwiesen, so doch äusserst selten statthat, und ausserdem würde das Ei sich nicht bis zum 5. Monat entwickelt haben, denn die Anaemie bestand ja auch schon zur Zeit der Conception, allerdings wird die Anaemie mit fortschreitender Schwangerschaft auch zugenommen haben.

Die Blutung bei der Geburt soll nicht unbedeutend gewesen sein; hörte aber nach Entfernung der Placenta durch die Hebamme, Zimmtinctur auf. Die Lochien waren innerhalb der ersten acht Tage blutig, zeitweise bedeutende, bislang klagt Wöchnerin nur über grosse Schwäche. In der zweiten Woche des Puerperiums stellte sich ein übelriechender, bräunlicher wässriger Ausfluss aus den Genitalien ein. Wöchnerin begann zu klagen über Druckschmerz in der rechten Inguinalgegend und bald auch in der rechten untern Extremität, welch letztere im Verlauf der nächsten Tage allmählig anschwell.

Dies war denn die schliessliche Veranlassung, dass am 15. Tage post partum ärztliche Hilfe gesucht wurde.

Status praesens. 25. Febr. ziemlich hochgradig anaemische Frau; mässiges Fieber; Puls klein. 88. Respiration regelmässig. 20. anämische Klappengeräusch, Lunge normal. Leber etwas über den Rippenrand vorragend. Abdomen hart und aufgetrieben; in der rechten Inguinalgegend (Uterusrand) auf Druck bedeutende Schmerzempfindung; kein Oedem der Labien. Geschwüre in der Scheide konnten nicht wahrgenommen werden.

Braunrothe, wässrige, übelriechende Genitalsecretion;

¹⁾ Schröders Lehrbuch der Geburtshilfe p. 420.

Uterus vergrößert, etwas aufelectirt, von Aufsen rechts der linea alba deutlich fühlbar; rechts seitlich vom Uterus war bei combinirter Unterfuchung vermehrte Resistenz leicht zu fühlen. Der rechte Oberschenkel bedeutend oedematoes, sehr schmerzhaft bei Berührung; die vena cruralis als harter Strang deutlich fühlbar. Appetit sehr gering; bedeutend gesteigertes Durstgefühl, hartnäckige Stuhlverstopfung. Bis zum 29. trotz roborirender Behandlung und milder Evacuantiën keine Besserung. Temperatur 38.7 Puls 84. Stuhl retardirt.

2. März. Schmerz im Abdomen nimmt zu; starker Meteorismus; die resistente Stelle rechts am Uterus vergrößert sich; die Genitalsecretion ist etwas heller geworden und hat den üblen Geruch fast verloren auf Einspritzungen von 4⁰/₁₀ Carbolsäurelösung. Temperatur 39. Puls 92.

5. März. Brandige Fetzen gehen ab; die Secretion wird wieder stinkend.

6. März. Morgens gewaltige Blutung.

Zu Patientin gerufen, kam mir auf dem Wege dahin schon die Nachricht von dem schnell eingetretenen Tod.

Eine Section, die ich dringend verlangte, war nach längerem Zureden auch bereits zugestanden, eben so schnell jedoch nach Einholung von pfarrherrlichem Rathe entschieden wieder verweigert. Auch einer von den vielen Fällen, wo simpler religiöser Aberglaube wissenschaftlicher Beobachtung werthvolle Objecte hinterzieht.

Es liegt hier unzweifelhaft ein puerperaler Infectionsprocess vor mit secundärer Blutung und zwar eine Infection auf dem Wege der Selbstinfection.

Zum Begriffe einer Infection gehört bekanntlich ein die Infection bedingendes Gift, ein Contagium vivum, von

dem Prof. Liebermeister¹⁾ sagt: „Die Discuffion über das Contagium vivum ist die wichtigste Frage in der medicinischen Wissenschaft und wenn wir die Aufgabe der Wissenschaft nicht einzig und allein finden in der Zusammenhäufung möglichst grosser Massen von empirischen Material, wenn wir vielmehr den Versuch einer Anordnung desselben nach theoretischen Gesichtspunkten für berechtigt und für zweckmässig halten, und wenn wir bei der Forschung nach dem Zusammenhang der Thatfachen auch vor den dabei sich ergebenden Folgerungen nicht zurücktreten, so werden wir kaum umhin können zuzugestehen, dass schon in den seit langer Zeit allgemein bekannten Thatfachen zwingende Gründe vorliegen, welche mit Nothwendigkeit zu der Annahme eines Contagium vivum oder wenigstens zu einer nahe verwandten Hypothese führen müssen.“

Ueber die Natur des Ansteckungsstoffes gibt es zwei Hypothesen: die eine lautet dahin, dass die Gifte der Infectionskrankheiten aus lebenden Wesen, aus niederen Organismen bestehen, daher der Name Contagium vivum seu animatum.

Die andere Theorie führt die Gifte auf chemische Proceffe (Gährung und Fäulniss) zurück.

Obengenannter Autor lässt sich darüber folgendermassen vernehmen: „seitdem wir wissen, dass diejenigen Gährungsproceffe, welche hier allein in Betracht kommen können und die wir als Gährungen im engeren Sinne bezeichnen wollen, sämmtlich an die Gegenwart und die Vermehrung niederer Organismen gebunden sind, ist die Gährungstheorie so gut wie identisch mit der Theorie des Contagium vivum s. animatum geworden.

Es ergibt sich demnach aus der Thatfache der unbe-

¹⁾ Handbuch der acuten Infectionskrankheiten. Ziemsen Handbuch der spec. Patholog. und Therapie. Z. b. Leipzig 1876.

grenzten Vermehrungsfähigkeit der Krankheitsgifte mit zwingender Nothwendigkeit die Theorie vom *Contagium vivum*.“

Es wäre natürlich gänzlich falsch hier zu glauben, dass die gewöhnlichen Fäulnissorgane identisch sind mit den Giften des Typhus abdom; Pyaemie, des Puerperalfiebers; es gibt ebensoviele Arten als es specifisch verschiedene Infectiouskrankheiten gibt.

Eine Infectiouskrankheit hat als Ursache einen bestimmten Krankheitserreger; je nachdem dieser in dem an der specifischen Krankheit leidenden Organismus entsteht, spricht man von *Contagium* und von *Miasma* dann, wenn der specifische Krankheitserreger ausserhalb und unabhängig von einem erkrankten Organismus sich erzeugt.

Wie bekannt sind die Meinungen in Betreff des Puerperalfiebers, ob dasselbe lediglich rein contagiös oder das Produkt eines Miasmas sei, gespalten. Prof. Liebermeister und mit ihm wohl die grössere Anzahl rechnen das Puerperalfieber zu den rein contagiösen Infectiouskrankheiten.

Prof. Liebermeister in v. Ziemssens Handbuch der spec. Path. u. Therap. sagt in seiner Eintheilung der acuten Infectiouskrankheiten: „Bei all den rein contagiösen Infectiousprocessen kann die Uebertragung von einem Individuum auf das andere durch Contact erfolgen; aber es ist freilich der unmittelbare Contact nicht nothwendig Bedingung für diese Uebertragung, vielmehr kann dieselbe auch mittelbar erfolgen durch Instrumente, durch Effecten, durch dritte Personen, bei manchen dieser Krankheiten auch durch die Luft Unter allen Umständen — und das gehört nothwendig zum Begriff der rein contagiösen Krankheit — hat das Gift auf dem Wege von dem inficirenden zu dem inficirten Organismus keine besondere Entwicklungsstadien mehr durchzumachen, sondern es befindet sich zu

der Zeit, wenn es als wirkfamer Krankheitserreger aufgenommen wird, im Wesentlichen noch im gleichen Zustande, wie es von dem abgebenden Organismus gebildet wurde.

Bei den rein miasmatischen Infectiouskrankheiten entwickelt sich der Krankheitserreger ausserhalb; seine Aufnahme in einen höheren Organismus ist für seine Reproduction nicht nothwendig und desshalb für das Leben des Krankheitserregers gewissermassen etwas zufälliges; innerhalb des Körpers scheint er eine unbestimmte Zeit hindurch weiter zu vegetiren und zwar, so weit wir aus den Symptomen schliessen können, mit rhythmisch sich wiederholenden Entwicklungsphasen:

An der Hand einer äusserst bescheidenen mir zu Gebote stehenden Literatur — wie eben der Fall wenn man fern vom Knotenpunkte wissenschaftlichen Lebens und Schaffens leben muss — möchte ich versuchen die andere Ansicht über das Wesen des Puerperalfiebers — dass es das Product eines Miasmas sei — vorzuführen.

Nachdem Semmelweiss und Scoda Ende der 40er Jahre mit der Ansicht aufgetreten waren, dass die puerperale Erkrankung auf cadaveröser Infection beruhe, gab ersterer etliche Jahre später zu, dass es auch noch andere Infectionswege gebe. Hensch spricht im Jahre 1854 neben Infection durch putride Stoffe auch schon von miasmatischen Einflüssen. Scanzoni bezeichnet in seinem Lehrbuch der Geburtshilfe 4. Auflage 1867 das Puerperalfieber als eine Infectiouskrankheit, hervorgegangen aus der Aufnahme putrider Zersetzungsproducte animalischer Stoffe in die Blutmasse, welche eine Veränderung erfährt, die, ohne ihrer Wesenheit nach besonders erforscht zu sein, sich während des Lebens als in der Leiche durch die der Blutdissolution zugeschriebenen Erscheinungen manifestirt.“

Prof. Winkel in Rostock (Pathol. u. Therap. des Wochen-

bettes) sagt in Betreff der Aetiologie des Puerperalfiebers, dass eine miasmatische Entstehung des Puerperalfiebers, wenn nicht ganz von der Hand zu sein, so doch nicht die hauptsächlichste Verbreitungsweise sei.

Dr. Wahl beobachtete im vorigen Jahre eine Epidemie des Puerperalfiebers und kommt dabei zu folgendem Schlussatz: „Das Puerperalfieber ist eine Infectiouskrankheit, hervorgegangen aus der Aufnahme putrider Zerfallsproducte in die Blutmasse der Wöchnerinnen, welche nicht nur durch die bekannten Veränderungen einfacher Verletzungen der Gebärenden, sondern auch durch Uebertragung putrider Zerfallsproducte animalischer Stoffe durch Hände und Instrumente Hilfe leistender eintreten kann. Es ist aber auch eine miasmatische Krankheit, welche sowohl in engbegrenzten Räumen, als in grösseren Bezirken unter günstigen Verhältnissen selbstständig auftritt.“

Es würde demnach das Puerperalfieber in die Gruppe der „miasmatisch - contagiösen“²⁾ Infectiouskrankheiten zu rechnen sein. Das Puerperalfieber hätte dann mit den miasmatischen Krankheiten das gemein, dass das Gift zunächst von Aussen bezogen wird, würde sich hingegen von demselben dadurch unterscheiden, dass das Gift ausserhalb des Körpers nur entsteht, wenn ein kranker Körper den Keim geliefert hat.“

Da es entschieden von practischer Bedeutung ist das Verhältniss des Puerperalfiebers zum Gesamtorganismus zu kennen d. h. ob die puerperale Infection eine allgemeine oder locale Infectiouskrankheit sei, so sei erwähnt, was mein schon mehrerwähnter Autor, Prof. Liebermeister darüber sagt: „Nur für einen Theil der Infectiouskrankheiten können wir bisher mit Sicherheit angeben, ob sie zu den allge-

¹⁾ Aerztlich. Intelligenz-Blatt. 1877 Nr. 14. ²⁾ Ziem's. Handbuch d. spec. Path. u. Therap. Bd. II. 2. Auflg. p. 33.

meinen oder zu den örtlichen gehören Einige andere Krankheiten können nicht in eine von diesen zwei Gruppen untergebracht werden. Bei der Diphtherie sind die ersten Affectionen die örtlicher Natur, aber im späteren Verlauf kann das Gift in den Kreislauf aufgenommen und so vollständig durch den ganzen Körper verbreitet werden, dass die Krankheit dadurch zu einer Allgemeinaffection wird. Ein ähnliches Verhalten dürfte auch bei der Pyaemie und dem Puerperalfieber anzunehmen sein.“¹⁾

Kehren wir zu dem uns vorliegenden Falle zurück, so ist hier — denn sämtliche Verhältnisse sind dazu ange-
than — entschieden an eine Aufnahme septischer Stoffe in die Blutmasse zu denken, also ein septicaemischer Process, in dem das putride Gift von irgend einem Fäulnisheerd entwickelt auf irgend einem Wege ins Blut gelangt ist und zwar kann mit Bestimmtheit angenommen werden, dass hier ein autochthoner septicaemischer Process vorliegt i. e. Selbstinfection.

Was die Resorptionswege des putriden Giftes anlangt, soferne es sich um heterochthone Septicaemie handelt d. h. befindet sich der Fäulnisheerd nicht am eigenen Körper des erkrankten Individuum, — so können diess nur die Luftwege und Verdauungswege sein. Die Gase der Fäulnis sowohl als auch die staubförmigen Partikelchen getrockneter putrider Substanzen können von der Schleimhaut der Nase, des Rachens, Larynx, Trachea und Bronchien aus bei der Inspiration in die Circulation kommen. Durch Schlucken können wieder die eben erwähnten Fäulnisgase und Fäulnisstaub und auch beim Essen fauliger Substanzen Stücke dieser fauligen Substanzen mit der Schleimhaut der Verdauungswege in Contact kommen.

¹⁾ cod. loc. pag. 36.

Otto Webers¹⁾ Versuche über die Wirkungen des Schwefelwasserstoffes — Schwefelwasserstoff wenn er in's Blut gelangt, ruft eine den septischen Darmentzündungen durchaus entsprechende Erkrankung hervor, welcher auch die Hauptsymptome während des Lebens der Thiere angehören — sprechen dafür dass die Gase wirklich in Betracht zu kommen haben.

Der Staub, welcher von vertrockneten Fäulnisprodukten aus in die Athmosphäre gelangt, enthält nach Panums Versuchen ganz zweifellos putrides Gift. Allerdings sind andererseits die Resorptionsbedingungen auf den Schleimhäuten des Respirations- und Digestionsapparates nach den experimentellen Erfahrungen für Aufnahme putrider Gifte in die Circulation sehr ungünstig. Es ist aber dennoch die Möglichkeit der Resorption septischer Stoffe auf diesem Wege doch nicht ganz auszuschliessen und darnach die stricte Definition des Puerperalfiebers nach Schröder²⁾ mit etwas Vorbehalt aufzunehmen sein: „Unter den Namen Puerperalfieber fasst man alle diejenigen Erkrankungen von Wöchnerinnen zusammen, die durch eine septische, von den Genitalien ausgehende Infection des Organismus hervorgebracht wurde. Zum Zustandekommen dieser Infection ist eine Wunde nöthig, von der aus das septische Gift aufgenommen wird. Die Quelle des Infectionstoffes kann ausser oder im betreffenden Organismus selbst liegen.“

Bildet sich ein Fäulnisheerd am eigenen Körper des Individuum, so liegt ein autochthoner septicaemischer Process vor i. e. Selbstinfection. Dass sich am eigenen Körper Fäulnisheerde bilden können, zeigen namentlich Panums³⁾ Ver-

¹⁾ Experim. Studien über Pyaemie, Septicaemie und Fieber. Deutsch. Klinik 1864 Nr. 48—51. 1865 2. 5. 7. 8. ²⁾ Lehrbuch der Geburtshilfe von Dr. C. Schröder. Bonn 1874. ³⁾ Virchows Archiv für path. Anatomie Bd. XXV.

fuche recht deutlich, der um einen septicaemischen Zustand durch Selbstinfection zu erzielen, bei Thieren durch einfache Embolie der Darmarterien grosse Stücke der Darm Schleimhaut necrotisch werden liess, welche sich faulich zersetzten.

Die Bedingungen für die Resorption des putriden Giftes durch den Respirations- und Digestionsapparat, sind hier natürlich dieselben wie bei der heterochthonen Fäulniss. Ausser diesen allerdings nicht sehr beträchtlichen Möglichkeiten der Resorption kommt bei der autochthonen Fäulniss der ungemein wichtige Vorgang hinzu d. i. die Resorption des putriden Giftes durch Blut- und Lymphgefässe. Ein Modus dieser Resorption besteht in der Diffusion und endosmotischen Ausgleich des in wässriger Lösung sich befindenden putriden Giftes, so dass das Gift unmittelbar in das strömende Blut gelangt und durch die Venen zum Herz und von diesem in den gesammten Kreislauf getragen wird. Die Existenz dieses Modus hat Bergmann nachgewiesen, indem er experimentell die Diffusibilität des putriden Giftes darthat.¹⁾

Stellt man sich das putride Gift in molecularer Form vor oder an die fäulniserregenden Organismen gebunden, so ist die Möglichkeit einer Einwanderung dieser Molecule oder Organismen durch die Gefässwand in das kreisförmige Blut gegeben, da Cohnheim beobachtete, dass weisse Blutkörperchen aus den Gefässen bei der Entzündung auswandern und Recklingshausen feststellte²⁾, dass Bindegewebszellen mit Zinoberkörnern durch die Gefässwand in den Thrombus einwanderten.

Ein anderer Resorptionsmodus kann durch Imbibition des putriden Giftes in die Gefässthromben statthaben.

Durch die Arbeiten von Recklingshausen, Ludwig

¹⁾ Bergmann, Das putride Gift und die putride Intoxication. Dorpat 1868. ²⁾ Centralblatt für med. Wissenschaft 1867.

wurde erwiesen, dass die Bindegewebsräume in freier Communication mit den Anfängen der Lymphgefässe stehen. Es ist darnach sehr einleuchtend, dass die Lymphgefässe der bequemste und sicherste Weg sind für die Aufnahme der Fäulnisproducte.

Zu der Möglichkeit der Resorption putrider Stoffe auf den beschriebenen Wegen gehört noch eine wirkende Kraft, ein Druck, welcher auf der in die Gewebe einbibirten putriden Flüssigkeit lastet und das putride Gift durch die Blutgefässwände in das Blut einströmen macht. Dieser Druck spielt nach Hueter¹⁾ für die Entstehung der septicaemischen Fieber eine capitale Rolle. Sticht man eine Injectionspritze, mit blaugefärbter Leimlösung gefüllt, in das Gewebe des Hodens ein, so gelingt es unter dem Drucke des Spritzenstengels, sei derselbe manuell oder durch eine Quecksilberfäule hervorgebracht, die Lymphgefässe des Saamenstranges zu füllen. (Ludwig.) So vermag auch der Druck, welcher auf der in die Gewebe einbibirten putriden Flüssigkeit lastet, diese Flüssigkeit in die grösseren Lymphgefässe zu treiben. Ausgeübt wird der Druck durch die entzündliche reactive Schwellung der Gewebe, durch die einklemmenden Fascien, Bänder, Muskeln und Knochen.“

Und um die eminente Bedeutung dieses Druckes eindringlichst hervorzuheben fährt derselbe Autor weiter: „Man kann einen Fäulnisheerd am Körper in Betreff der Möglichkeit für die Entstehung der septicaemischen Fieber für nahezu harmlos erklären, sobald nur die putride Flüssigkeit unter keinem oder sehr geringem Drucke steht. Mag der grösste Theil der Haut durch eine Verletzung necrotisch geworden und der Putrescenz anheimgefallen sein; vielleicht werden zwei Quadratfuss solcher Haut

¹⁾ Die septicaemischen und pyaemischen Fieber von Prof. C. Hueter 1868.

weniger gefährlich sein als ein Quadratzoll von faulem Gewebe, welches unter dem Drucke der Fascie und der anschwellenden interfascialen Weichtheile steht.“ Ueber den Ursprung des Fäulnissherdes bei autochthoner Febris puerperalis lässt sich nicht immer mit Bestimmtheit urtheilen. Ist es durchaus nicht zweifelhaft, dass zurückgebliebene Blutcoagula oder Eireste verjauchen und so zu septischer Eudometritis und den ganzen Complex der als Febris puerperalis bekannten Erscheinungen herbeiführen kann, so findet diess — wie Schroeder in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe sagt — doch jedenfalls nur in der Minderzahl der Fälle statt und fügt einen Fall an, in dem die Wöchnerin, die an jauchiger Eudometritis gestorben war, einen wallnussgrossen Placentarrest zeigte, in dem aber der vorgeschrittene, jauchige Zerfall der Decidua vera bei nur oberflächlicher Betheiligung der Placentarstelle und frischen Aussehen des Placentarstückes auf dem Durchschnitt, augenscheinlich dafür sprach, dass das Letztere an dem jauchigen Zerfall des Eudometriums unschuldig war.

Es ist dadurch ein weiteres Moment für die Abstammung des Fäulnissherdes gewonnen, nemlich die Verjauchung der decidua vera, wenn diese abnorm gewuchert und im Uterus zurückgeblieben ist.

Was die Leichtigkeit des Zurückbleibens von Ei und Eihäuten anlangt, so gibt Stadfeldt (Hospitals Fide N. 52 1861. v. Schmidts Jahrbücher B. 118) an, dass er bei 70 Sectionen von Wöchnerinnen 7 mal wallnuss- bis gänseei-grosse Stücke des Placenta im Uterus gefunden habe und zwar war darunter 5 mal die Nachgeburt durch Hilfe der Natur abgegangen. Auch Scholz (österreich. Zeitschrift für pract. Heilkunde 1860 v. Schmidts Jahrbücher B. 112) sah bei spontan abgegangener Nachgeburt einen Placentarrest zurückbleiben und Prof. v. Hecker (Mag. f. G. B.

VII) theilt zwei ähnliche Fälle mit. Auch Hueter (M. f. G. B. IX) fand einen Placentarrest nach spontaner Ausstossung des Mutterkuchens. Daselbe finden wir bei Hegar (Sterblichkeit &c. 57.) und Schröder (Fibr. und Plac. Polypen. Würzburg 1870). Ist das Zurückbleiben von Eiresten nach spontaner Placentalösung fogar nichts Ungewöhnliches, um wie viel mehr denn nach künstlicher Lösung oder nach Anwendung des fog. Credé'schen Handgriffes, der doch auch nicht zu den natürlichen Expressionsmitteln gerechnet werden kann, sei es nun, daß eine stärkere Verwachsung nach interstitieller mit Bindegewebswucherung einhergehender Placentitis¹⁾ eines Stückes des Mutterkuchens eingetreten ist — die dadurch bedingte lederartige oder leberartige Festigkeit dieses Stückes entzieht den darauf sitzenden Theil des Fruchtkuchens den Uteruscontractionen, welche zur Placentalösung dienen, sei es daß Plac. succentariatae vorhanden waren und zurückgeblieben sind.

Von wo aus der Fäulnisherd in vorliegendem Falle ausging ist nicht anzugeben, da nach obigen Angaben selbst dem geübtesten Auge ein Defect der Placenta entgehen kann und zudem eine aufmerkfame und genaue Untersuchung der Nachgeburt von Seite unserer Landhebammen ein frommer Wunsch ist und wohl bleiben wird.

Ist der puerperale Infektionsprozeß mit all seinen Erscheinungen gesetzt, so fragt es sich woher in vorliegendem Falle wohl die Blutung stamme? Wie bekannt rühren solche Blutungen selten von langsam vernarbenden oder wieder eröffneten Wunden der Vulva, von Neubildungen des Genital-Kanales, oder necrotisirenden Theilen der Scheide her, bei deren Ablösung Gefäße eröffnet werden.

¹⁾ Hegar. Path. und Ther. der Placenterretuction. Berlin 1862.

Prof. Kehrer theilt in der Wien. med. Wochsch. einen in der Giefsener Klinik beobachteten Fall mit, wo durch Quetschung bei einer Zangengeburt und allgemeiner Beckenenge an der hintern Scheidewand ein Schorf entstand, der sich in der dritten Woche ablöste, wodurch eine furchtbare Blutung aus der Art. hypog. sin. entstand. Dafs an derartige in unferm Falle nicht zu denken, ist von vornherein evident.

Am häufigsten haben derartige Blutungen ihren Ursprung in der Placentarstelle und kommen namentlich dann vor, wenn die Wöchnerin zu früh aufsteht, oder doch auch während sie noch zu Bette liegt.

In dem einen Falle, dafs das Wochenbett normal ist, kann es geschehen, dafs die noch nicht völlig organisirten placentaren Blutpfropfe herausgepreßt werden durch gesteigerten Blutdruck, mag nun vorzeitiges Aufstehen oder die Drehung der breiten Mutterbänder bei Rückwärtsbewegung oder sonst ein Kreislaufshindernifs den Blutrückfluß aus den Uterusvenen erschweren, oder eine körperliche Anstrengung, eine Gemüthsbewegung &c. die Herzthätigkeit und damit natürlich auch den arteriellen Blutdruck erhöhen. In Folge von Kreislaufstörungen und Herzfehlern tritt nothwendigerweise eine Störung in den Venen der untern Körperhälfte ein; in den durch die Stauung gespannten Venen speciell in denen des Uterus wird der Blutdruck ein bedeutend höherer werden und die Thrombenpfropfe durch denselben aus den Venen herausgepreßt. Die Folge ist eine bedeutende Haemorrhagie; Kiwisch führt als Ursache derselben ausserdem abnorm weite Venenmündungen der Placentarstelle an.

Derartige profuse Blutungen in puerperio können aber auch auf pathologischen Veränderungen der Uterusgefäße beruhen. So berichtet Prof. v. Hecker in M. f. G.

B. 7 über eine tödtliche Blutung aus einer hochgradig ectatischen Vene des Cervix. Graily Hewitt¹⁾ beobachtet einen lethalen Ausgang infolge wiederholter Blutungen aus einem freiliegenden aneurysmatischen Sack der Uterusarterie. Johnston theilt einen Fall mit, in dem die tödtliche Blutung durch Ruptur eines Thrombus des Cervix hervorgerufen wurde. Mikschik sah eine Haemorrhagie aus einer rabenkielddicken durch ein Ulcus im Cervix arrodirten Stelle erfolgen.

Nun gibt es dann aber auch Fälle in denen im Wochenbett ein Endometritis auftritt, die diphtheritischen Charakter annimmt; ein etwa zurückgebliebener Placentarrest bildet sich nur mangelhaft zurück oder es kommt zum necrotischen Zerfall desselben oder es lösen sich croupös resp. diphtheritische belegte Deciduastücke ab, wodurch eine Wiedereröffnung von Gefäßen und eine profuse Blutung statthat.

Auf dem Wege der Exclusion — und nur auf diesem ist wohl eine diesbezügliche Diagnose zu stellen, glaube ich berechtigt zu sein zu der Annahme, daß die in Folge des septicämischen Infectionsprozesses entstandene Endometritis einen diphtheritischen Charakter angenommen habe, daß also die Schleimhaut des Uterus resp. zurückgebliebene Deciduastücke schnell necrotisirten. An dieser Necrose der Uterus Schleimhaut wird sich im Weiterschreiten des Processes auch die Placentarstelle betheiligt haben; einige diphtheritische Schorfe der Decidua und auch der Placentarstelle wurden am vorletzten Tage der Krankheit deutlich wahrnehmbar ausgestoßen; ein anderer Theil wird wie die weitere Beschaffenheit der Genitalsecretion zur Annahme zwingt, zerfallen sein; an diesem Zerfall werden wohl auch die Thromben der Placentarstelle theilgenommen haben.

¹⁾ Schröder, Lehrbuch der Geb. p. 751.

Diese beiden Momente in Verbindung damit, daß der Uterus selbst bei diesen Formen der Endometritis niemals ganz unbetheiligt bleibt, sondern schlecht contrahirt ist und seine Substanz eine oedematoese Durchfeuchtung zeigt¹⁾ mögen im Stande gewesen sein offene Venenmündungen erzeugt und dadurch die tödtliche Blutung herbeigeführt zu haben.

Daß es sich hier um Wiederöffnung von Venenmündungen durch Ablösung diphtheritischer Belege und Zerfall von Thromben an der Placentarstelle handelt und nicht etwa um eine Blutung durch fibrinöse oder Blutpolypen, dafür fehlen die Merkmale hiezu. Bei diesen Placentarpolypen (nach C. Braun) oder beim polypenförmigen Haematom (Virchow Geschwülste I) fühlt man meist oberhalb des innern Muttermundes im Cavum uteri, selten im geöffneten Cervicalkanal die abgerundete Spitze einer derben Geschwulst mit glatter Oberfläche. Geht man zwischen dieser und der Uteruswand mit dem Finger in die Höhe, so trifft man meist hoch oben auf den breiten oder stielartig verlängerten Ansatzpunkt. Nichts von dem war zu fühlen.

Eine andere Erklärung der Blutung in der Annahme von Haemophilie zu suchen, ist nicht statthaft, denn auch hiefür bieten sich keine Anhaltspunkte aus der Anamnese und auch nicht aus der Untersuchung wozu Prof. Kehrер folgende Anhaltspunkte gibt:²⁾ „Man findet die Scheide und den mehr oder minder verkleinerten Uterus ausgefüllt mit frischem Blutgerinnsel: in der Uterushöhle findet man keine Placentastücke mehr, wenn die Weite des inneren Muttermundes die Austastung des Cavum uteri gestattet. Man erfährt, dass von Zeit zu Zeit unter Wehen Blutgerinnsel abgehen des Tages 1—3 oder vielleicht alle

¹⁾ Sc röder, Lehrbuch der Geb. p. 788. ²⁾ Prof. Kehrер, Spätblutung im Wochenbett. Wien. med. Wochenschrift 1868.

paar Tage eines. Die Gerinnfel bestehen aus Blutkuchen und stellen getreue Ausgüsse der Uterushöhle dar. Man erkennt daran einen cylindrischen oder leicht ausgebauchten mit Furchen und Gruben versehenen Cervicaltheil, durch eine dem inneren Muttermunde entsprechende tailleartige Einschnürung abgegrenzt von einem mehr oder minder abgeplatteten, dreieckigen, dem Carum uteri entsprechenden Theile mit oberen seitlichen, zuweilen gipfelartigen ausgezogenen Ecken (an den Tubenmündungen) und zugespitzten Rändern.“

Nach Alledem würde keine andere Erklärung der Blutung übrig bleiben als die angegebene.

Der durch die Blutung veranlasste tödliche Ausgang hätte möglicherweise bei möglicher augenblicklicher Hilfe noch abgewandt werden können, doch ist die Therapie mit Haemostaticis gewiss nicht im Stande wenn auch vielleicht die Blutung zum Stillstand zu bringen, eine höchst wahrscheinliche neueintretende Haemorrhagie zu verhindern.
